

FORMÆ SPECIESQUE NOVÆ REDUVIIDUM,

Describe a CAROLO STÅL.

(Séance du 27 Août 1862.)

EPIDAUS Stål.

1. E. LATISPINUS. — *Sordide flavo testaceus; maculis parvis sparsis hemelytrorum albo-mucoreis; membrana sordide hyalina; abdomine nigro-fusco, limbo flavo-testaceo, dorso pone medium fuscis duabus flavo-sericeis, ventre utrinque maculis, albido-sericeis ornato.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. $4 \frac{1}{2}$ mill — Sumatra (Mus. Brit.); Ligor, Malacca (Coll. Stål).

Caput pone antennas acute tuberculatum. Thorax lobo antico basi tuberculis duobus parum elevatis instructo; lobo postico spinis lateralibus acutis, medioeribus, discoidalibus latis, compressis, apice subampliatis, truncatis, apice antice acuminatis; marginibus posterioribus elevatis, angulis posticis tuberculato-prominulis. Abdomen apicem versus sensim ampliatum.

2. E. VALIDISPINUS. — *Flavo-testaceus; thorace, pectore maculisque duabus parvis mediis corii albo-mucoreis; thorace fusco-testaceo, hujus spinis validis discoque ventris nigricantibus.* — ♂, ♀. — Long. 22-27 mill.; lat. $4 \frac{1}{2}$ -5 mill. — Malacca (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Caput pone antennas acute tuberculatum. Thorax lobo postico spinis lateralibus et præsertim discoidalibus validissimis, acutis, simplicibus, his illis fere duplo longioribus. Abdomen utrinque leviter rotundato-dilatatum.

3. E. FURCULATUS. — *Nigricans; maculis tribus anticis, media parva, lateralibus majusculis, lobi antici thoracis flavo-sericeis; maculis duabus basalibus scutelli, compturibus sparsis hemelytrorum; nonnullis lateralibus pectoris, nec non parvis ventris, in seriem lateralem utrinque dispositis, sordide albido-sericeis; limbo abdominis flavo-testaceo.* — ♂, ♀. — Long. 18-22 mill.; lat. $3 \frac{1}{4}$ mill. — Sarawak, Borneo (Mus. Brit.).

E. transverso proximus, spinis thoracis longioribus. Caput pone antennis obtuse tuberculatum. Thorax lobo antico basi impresso, lobo postico spinis gracilibus, longiusculis, lateralibus acutis, discoidalibus apice furcatis, marginibus posterioribus elevatis, angulis posticis retrorsum nonnihil productis. Abdomen ultra medium sensim leviter ampliatum, dein utrinque rotundatum.

4. *E. CONSPERSUS*. — *Obscure fusco testaceus, parce sericeus; antennis pedibusque dilutioribus; ventre, excepto limbo, nigricante; maculis tribus anticis lobi postici thoracis maculisque tribus lateralibus pectoris sordide flavo-sericeis; maculis parvis sparsis hemelytrorum atisque ventris, in seriem lateralem utrinque dispositis, albido sericeis.* — ♂. — Long. 25 mill.; lat. 4 1/2 mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

E. maculigero proximus. Caput pone antennis obtuse tuberculatum. Thorax lobo antico basi impresso, lobi postici spinis gracilibus, medioeribus, omnibus integris, marginibus posterioribus leviter elevatis, angulis posticis productis. Abdomen ultra medium sensim ampliatum, pone medium utrinque obtusissime angulatum.

ENDOCHUS Stål.

1. *E. DICHROUS*. — *Obsolete punctulatus, niger, supra cum capite, articulo basali rostri, limbo lato ventris dorsoque abdominis dilute sanguineus.* — ♀. — Long. 25 mill.; lat. 5 mill. — Sylhet. (Mus. Brit.).

Var. *B.* Thoracis lobe postico posteriorius macula transversa nigra ornato.

Caput breviter spinosum. Thorax lobo antico medio longitrorsum impresso, lobi postici marginibus posterioribus reflexis, margine postico recto, angulis posticis haud productis, spinis lateralibus breviusculis.

2. *E. THORACICUS*. — *Subtiliter punctatus, niger, thoracis lobo postico luteo.* — ♂, ♀. — Long. 19 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Celebes, Menado (Mus. Brit.); Nova-Guinea, Dorei (Coll. Stål).

Caput pone antennis spinis medioeribus armatum. Thorax lobo antico longitrorsum impresso, lobi postici marginibus, postico vix, lateralibus posticis distincte reflexis, angulis posticis vix productis, spinis lateralibus medioeribus, spinis capitis æquilongis.

3. *E. ATRESPINUS*. — *Pallide griseo-stramineus; pedibus pallide testaceoflavescens; macula parva oblonga antica capitis; tuberculis apicalibus.*

maculis duabus parvis lateralibus, alia aut alteram posita, impressioneque basali lobi antici nec non spinis lobi postici thoracis, macula basali scutelli, macula laterali mesostethii, maculisque parvis ventris, in seriem lateralem dispositis, nigris. — ♂, ♀. — Long. 22 mill.; lat. 3 1/2 mill. — India orientalis, Sumatra (Mus. Brit.).

Caput pone antennas spinis brevibus crassis armatum. Thorax lobo antico basi impresso, lobi postici spinis lateralibus mediocribus, marginibus lateralibus posticis distincte, postico vix reflexis, angulis posticis leviter productis.

4. E. FAMULUS. — *Testaceo-flavescens; capite pone oculos maculaque marginali media abdominis nigris; hemelytris maculis nonnullis parvis, unaque media majore, albido-sericeis.* — ♀. — Long. 20 mill.; lat. 4 mill. — India orientalis-borealis (Mus. Brit.).

Thorace quadrispinoso pedibusque brevioribus a congenericis divergens. Caput pone antennas obtuse spinosum. Thorax lobo antico basi longitrorsum impresso, lobo postico quadrispinoso, spinis breviusculis, acutis, simplicibus, marginibus posterioribus leviter elevatis, angulis posticis rotundatis, leviter prominulis.

5. E. NEBULO. — *Sordide testaceus, remote sericeus; angulis lateralibus tuberculisque duobus lobi postici thoracis nigris; abdominis limbo fasciis lividis ornato.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 5 mill. — China borealis (Mus. Brit.).

Statura crassiore, antennis pedibusque brevioribus et crassioribus, abdomine latiore a congenericis divergit. Caput pone antennas acute alte tuberculatum. Thorax lobo antico pone medium longitrorsum impresso, lobi postici angulis lateralibus spinula obtusa armatis, disco tuberculis duobus brevissime subconicis instructo, marginibus posterioribus leviter elevatis, angulis posticis levissime productis.

EVAGORAS Burm., Stal.

1. E. ASSEDA. — *Corallina; antennis, spinis maculaque media lobi postici thoracis, hemelytris, exceptis basi ipsa parteque apicali corii, nec non pedibus nigris; membrana articulisque duobus apicalibus rostri fuscis; tuberculis apicalibus thoracis minus acuminatis.* — ♂, ♀. — Long. 16 mill. lat. 3 mill. — Ceram (Mus. Brit.).

Var. B. *Maculis lateralibus disci ventris, in seriem dispositis, nigris.*

2. E. ATRIPES. — *Corallina: autcanis, spinis thoracis ferr totis, clavo pedibusque, exceptis coris, nigris; articulis duobus apicalibus rostri membranaque fuscis; tuberculis apicalibus thoracis acuminatis, apice extrorsum, haud antrosum, prominulis.* — ♂. — Long. 15 mill.; lat. 3 mill. — Insula Batschian (Coll. Stål).

3. E. DOLOSA. — *Lutescens; antennarum articulis primo apice, nec non secundo, tertio et quarto fuscis, secundo medio pallidior; macula media lobi postici thoracis clavoque nigricantibus; tuberculis apicalibus thoracis acuminatis et apice antrosum curvatis.* — Long. 15 mill.; lat. 3 mill. — Insula Ke (Mus. Brit.).

Var. B. *Maculis lateralibus disci ventris nigris.*

ISYNDUS Stål.

1. I. ULYSSES. — *Flavo-cinnamomeus; capite superne, antennis, lobo antico nec non spinis marginisque basali lobi postici thoracis, scutello, clavo, femoribus superne nec non maculis parvis lateralibus pectoris ventrisque nigris; membrana fusco-ænea.* — ♀. — Long. 32 mill.; lat. 6 mill. — Laos (Coll. W. W. Saunders).

Congenericis gracilior, omnino aliter pictus et coloratus. Antennæ articulo tertio basin et apicem versus flavo-testaceo. Thorax lobo postico angulis lateralibus spina horizontali armatis. Scutellum disco tuberculo parvo instructum. Abdomen nonnihil dilatatum.

2. I. OBSCURUS. — *Fusco testaceus, parce griseo-sericeus; lobo antico thoracis postice utrimque spina obtusa armato, postico inermi, angulis lateralibus rectis, parum prominulis.* — ♂, ♀. — Long. 21-26 mill.; lat. 5-6 mill. — China borealis (Mus. Brit.); Japonia (Coll. Stål).

Coloribus angulisque lateralibus lobi postici thoracis rectis, nec spinosis, a congenerico differt.

PRISTHESANGUS Am. et Serv.

Species sequentes ex insulis Philippinensibus thorace remote subgranulato, angulis posticis lobi postici valde productis, haud incrassatis, marginibus posterioribus elevatis, angulis lateralibus in dentem obtusum parvum prominentibus, lobo antico disco tuberculis duobus breviter subcyc-

Indricis armato abdomineque valde dilatato insignes sunt, nec inter se differunt nisi forma spinæ vel tuberculi scutelli coloribusque.

1. P. FURGIFER. — *Niger, pilosus; antennis, spina crassa, sat longa, erecta, cylindrica, apice dichotoma, scutelli nec non plaga media hemelytrorum testaceis.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 6 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

2. P. CONGREG. — *Piccus, pilosus; thorace lateribusque abdominis nigris; antennis flavo-testaceis; hemelytris fusco-testaceis, membrana hyalina, apicem versus infusata; spina scutelli suberecta, cylindrica, graciliuscula, apici incrassata.* — ♂. — Long. 23 mill.; lat. 6 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

3. P. PHEMIODES. — *Niger, pilosus; antennis, tibiis tarsisque flavo-ferrugineis; hemelytris lividis, membrana leviter infusata; scutelli disco tuberculo sat elevato instructo.* — ♀. — Long. 29 mill.; lat. 7 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

HELONOTUS Am. et Serv.

1. H. CALCITRANS. — *Testaceo-flavescens; antennis, capite ante oculos pedibusque, exceptis coxis trochanteribusque, nigris; articulo primo rostri fusco; abdomine chalybeo, ventre griseo-sericeo-fasciato, macula segmenti ultimi anoque flavescensibus.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 5 mill. — Ternate (Mus. Brit.); Batschian (Coll. Stål).

H. tuberculato valde affinis, aliter coloratus, tuberculis thoracis lobi antici gracilioribus, proportionaliter longioribus, apice subincrassatis et oblique truncatis, angulis posticis lobi postici productis minus incrassatis, abdomine utrimque paullo minus ampliato, rotundato, nec subangulato; tuberculo scutelli mediocri, uti in *H. tuberculato*.

2. H. ENSUGIENS. — *Flavo-testaceus; remote griseo-sericeus; thoracis lobi antici tuberculis acutiusculis, intus posterius tuberculo parvo, saporissime acuto. in ♀ quam in ♂ distinctiore, armatis, lobi postici tuberculis breviter subconicis, angulis posticis leviter prominulis, haud incrassatis; scutello tuberculo obtuse conico, sat elevato, armato.* — ♂, ♀. — Long. 18-21 mill.; lat. 3 1/2-4 mill. — Nova-Guinea, Dorei (Mus. Brit.); Insula Mysol. (Coll. Stål).

♂. Abdomine concolore, utrimque levissime rotundato-ampliato.

♀. Abdomine obscure chalybeo, utrimque magis et obtuse subangulato-ampliato, limbo angusto, medio interrupto, maculisque quatuor segmenti ultimi flavo-testaceis, femoribus, apice imo excepto, nigricantibus.

H. calcitranti valde affinis, tuberculis thoracis minus crassis, anticis intus tuberculatis, tuberculoque scutelli multo minus elevato differt.

PALOPTUS Stål.

1. *P. LONGISPINUS*. — *Nigricans vel flavescens-testaceus, femoribus abdomineque obscure fusco-testaceis, hoc utrimque angulato-ampliato, angulo apice acuminato et subretrosum vergente, limbo laterali, limbo anguli illius excepto, flavo-testaceo.* — ♀. — Long. 12-13 mill.; lat. 3 mill. — Nova-Guinea, Dorei (Mus. Brit.); Waigiu (Coll. Stål).

P. nigrosuti minor, abdomine utrimque angulato, thoracis lobo antico inermi, spinis lobi postici, praesertim discoidalibus, multo longioribus, his retrorsum nutantibus, distinctissimus.

ASTINUS Stål.

1. *A. PUSTULATUS*. — *Flavo-testaceus, pedibus posticis pallidioribus; thoracis lobo postico albo-mucoreo, lobo antico spinisque lobi postici denu- datis fusco-testaceis; corii macula pone medium pallida; abdomine fusco-testaceo vel nigricanti, vittula basali nec non limbo lato laterali, medio late interrupto, testaceo-flavescens; ventris disco maculis parvis albo-mucoreis, in series duas dispositis, ornato.* — ♂, ♀. — Long. 16-19 mill.; lat. 3-4 mill. — Sarawak (Mus. Brit.).

Congenericis, praesertim *A. modesto*, valde affinis; differt pictura abdomineque utrimque obtuse angulato-ampliato, spinis lobi postici thoracis discoidalibus acutioribus, tuberculis duobus basalibus lobi antici levissime elevatis.

HARPACTOR Lap.

1. *H. VALIDUS*. — *Nigricans, parve, in scutello thoracisque lobo postico anteriùs densius griseo-flavo-sericeus; antennarum articulis primo et secundo, apice femorum posteriorum tibiisque anticarum, tibiis intermediis et posticis nec non tarsis dilute sanguineis; abdomine utrimque leviter rotundato-ampliato, maculis ventris in seriem lateralem utrimque dispositis limboque apicali flavo-testaceis.* — ♂, ♀. — Long. 23-28 mill.; lat. 6-7 1/2 mill. — Tapayoz, Brasiliae (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Coloribus, forma abdominis antennisque gracilioribus a congenericis valde discrepans. Thorax lobo antico tuberculis duobus valde elevatis, apicem versus subito gracilioribus, armato, lobi postici tuberculis discoidalibus lateralibus valde retrorsum et subextrorsum nutantibus, tuberculo medio minore, leviter retrorsum producto, marginibus lateralibus anticis leviter rotundatis, obtuse crenatis. Scutellum apice haud productum.

2. H. GROSSUS. — *Cinnamomeus*; articulis primo et secundo antennarum rufescentibus; hemelytris fuscis, testaceo-venosis; limbo abdominis nigro. — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 7 mill. — Amazon (Mus. Brit.).

Præcedenti maxime affinis, an ejus varietas? coloribus diversis exceptis haud differt nisi tuberculis discoidalibus lateralibus lobi postici thoracis leviter sursum vergentibus.

HEZA Am. et Serv.

1. H. SPHINX. — *Griseo-straminea*; spinis thoracis apicalibus et posticis totis, spinis posticis lobi antici apice nigris; linea media limboque laterali ventris nigro-fuscis, margine laterali segmentorum secundi et tertii ante medium griseo-stramineo. — Long. 28 mill.; lat. 5 mill. — Ega. Brasiliae (Mus. Brit.).

Antennarum articulus primus capiti, thoraci scutelloque ad unum subæquilongus. Caput subcylindricum, collo retrorsum gracilescente, spinis oculo transverso vix longioribus, antrorsum leviter nutantibus. Thorax lobo antico apice utrimque spina, crassa et postice spinis duabus obtusis erectis armato; lobi postici spinis quatuor æquilongis, spinis posticis lobi antici duplo longioribus, acutis. Abdomen retrorsum sensim nonnihil ampliatum, segmento primo apice utrimque spinula armato.

2. H. FEROX. — *Fuscescente-cinnamomea*, pedibus posterioribus dilutioribus; abdomine flavo-cinnamomeo, ventris villa laterali fusca; hemelytris fusco-griseis, maculis minutis albido-mucorris conspersis, membrana fusca, apice sordide vitrea. — ♀. — Long. 29 mill.; lat. 5 mill. — Amazon (Mus. Brit.).

Antennarum articulus primus capite, thorace scutelloque ad unum paullo longior. Spinæ capitis et lobi antici thoracis mediocres, æquilongi, spinæ lobi postici thoracis illis duplo longioribus. Tibiæ anticæ leviter incrassatæ.

EULYES Am. et Serv.

1. E. ILLUSTRIS. — *Sanguineus, capite, antennis, rostro, lobo thoracis postico, scutello, excepto apice, pedibus, exceptis coxis, trochanteribus basique ipsa femorum, maculis abdominis discoidalibus octo, in series duas dispositis, maculisque quatuor magnis partis lateralis dilatatae nigris vel vivescenti-nigris, membrana violaceo-fusca.* — ♂. — Long. 31 mill.; lat. 6 mill. — Insulae Philippinenses (Mus. Brit.).

Congenericis descriptis statura maxime affinis, aliter pictus, abdomine magis dilatato differt. Lobus posticus thoracis violaceo-indutus.

2. E. DOHRNI. — *Niger, pilosus; parte laterali dilatata abdominis sordide eburneo, maculis magnis nigris ornata.* — ♂, ♀. — Long. 29-32 mill.; lat. 4 1/2-5 1/3 mill. — Dekan (Coll. Stål); Shanghai (Mus. Brit.).

Thorax impunctatus, medio longitrossum leviter impressus. Abdomen utrinque modice dilatatum, parte dilatata apice in ♂ pone apicem segmenti analis haud prominente, in ♀ minus producta.

YOLINUS Am. et Serv.

1. Y. AMPLIVENTRIS. — *Niger, nigro-pilosus; thorace albido-tomentoso; abdomine remote albido-piloso, ventre in parte laterali dilatata segmentorum duorum apicalium vittula obliqua dense albido-sericea ornato; rostri articulis duobus apicalibus piccis; antennis lutescentibus, basi apiceque articuli primi, nec non articulo secundo nigris; membrana vitrea, vena posteriore basique fuscis.* — ♀. — Long. 30 mill.; lat. 6 mill. — Celebes, Fondano (Coll. W. W. Saunders).

Thorax lobo antico sat convexo. Abdomen utrinque maxime rotundato-ampliatum, latitudine nonnihil brevius, lateribus violaceo-indutis, segmento ultimo utrinque ultra apicem ani paulo prominente. Tibiæ ante medium incrassatæ.

2. Y. BARO. — *Nigricans, plus minus in piccum vel fusco-testaceum vergens; annulis duobus articuli basalis antennarum, annulo versus apicem femorum lobisque duobus posticis lateralibus abdominis sordide stramineis; thorace fusco-testaceo; rostro apicem versus colloque capitis basi dilute*

piccis. — ♂. — Long. 15 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Cambodja (Mus. Brit.).

Nitidus impunctatus. Collum capitis nonnihil ante medium antrorsum sensim ampliatum. Abdomen segmentis primo, secundo et tertio nonnihil, tribus sequentibus valde lobato-dilatatis, parte dilatata segmenti primi longitudinali, segmenti tertii vix transversa segmentorum trium posteriorum late transversa; parte dilatata segmenti sexti postice ultra apicem segmenti analis haud prominente.

3. *Y. INEPTUS*. — *Testaceo-flavescens, parce pilosus et sericeus; lobo postico thoracis infuscato; antennis, maculis duabus parvis capitis pone oculos, hemelytris, apice imo femorum anteriorum, tibiis abdomineque ante medium nigris aut nigro-fuscis; femoribus posterioribus fusco-testaceis, prope apicem annulo pallidioribus ornatis; hemelytris parce albido-sericeis.* — ♂, ♀. — Long. 27-32 mill.; lat. 6 1/2-8 mill. — Cambodja (Mus. Brit.); Siam (Coll. Stål).

Collum capitis basi ipsa leviter impressum. Thorax impunctatus, disco longitrorsum latiuscule impressus. Abdomen utrimque modice ampliatum, margine sinuosum, segmentis partis dilatatae mediis leviter transversis. Tibiæ basin versus leviter incrassatae.

PHEMIUS Stål.

1. *P. CONSOBRINUS*. — *Niger, pilosus; antennis, rostro, tibiis tarsisque flavo-testaceis; membrana fusca; abdominis segmentis quatuor ultimis extus late sanguineo-limbatis; thoracis lobo antico disco tuberculis duobus parvis subconicis armato, lobo postico granulato.* — ♀. — Long. 28 mill.; lat. 6 1/2 mill. — Insulae Philippinenses (Mus. Brit.).

P. tuberculigerus affinis, nec differt nisi coloribus tuberculisque lobi anterioris thoracis multo minoribus. Apex imus articuli primi antennarum fuscus.

PARSIALUS g. n.

Corpus valde depressum. Caput longum, thorace longius. Antennae mediocres, articulo primo capiti subaequilongo. Rostrum subgracile, articulis primo et secundo longis, illo hoc nonnihil brevioribus. Thorax et scutellum inermia. Abdomen utrimque leviter dilatatum. Pedes mediocres, femori-

bus anticis leviter incrassatis; tibiis anticis femoribus cum trochanteribus æquilongis; unguiculis appendiculatis.

Sycano affine insigne genus.

1. *P. DEPRESSUS*. — *Nigro-fuscus, impunctatus, fusco-pilosus; limbo abdominis albido, nigro-maculato, segmento scuto et ano sanguineis; hemelytris leviter violacco-iridatis; tibiis basin versus leviter incrassatis.* — ♀. — Long. 18 mill.; lat. $\frac{1}{2}$ mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

2. *P. BRACHIALIS*. — *Niger, impunctatus, fusco-pilosus; annulo versus apicem femorum posteriorum parteque dimidia apicali tibiarum posteriorum, apice excepto, sordide stramineis; abdomine sanguineo, limbo nigro maculato, ventris disco maculis, in scriam lateralem utrimque dispositis, fuscis; tibiis ante medium nonnihil incrassatis.* — ♀. — Long. 17 mill.; lat. 4 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

SYCANUS Am. et Serv.

1. *S. CARDINALIS*. — *Niger; hemelytris limboque dilatato abdominis sordide sanguineis; membrana vinacea; antennis rostroque flavescence-piceis, hujus articulo basali fusco-piceo.* — ♀. — Long. 23 mill.; lat. 5 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

Thorax lobo postico subfortiter rugoso-punctato, lobo antico disco tuberculato-elevato. Scutellum tuberculo valde elevato, brevissime subeylindrico, simplici armatum. Abdomen utrimque, præsertim ante medium, valde rotundato-ampliatum.

2. *S. FALLENI*. — *Pilosus, sanguineus; capite, rostro, ventre, excepta parte laterali dilatata, pedibusque nigris; parte dilatata abdominis nigro-ænea, limbo laterali et postico segmentorum nec non coris maculaque posteriore meso et metastethii sanguineis.* — ♂, ♀. — Long. 23-26 mill.; lat. 5-5 $\frac{1}{2}$ mill. — Cambodja (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Thorax lobo antico nonnihil convexo, postico dense distincte punctato. Scutellum spina erecta discoidali, longa, (simplici?) armatum. Abdomen utrimque, præsertim ante medium, valde rotundato dilatatum, parte dilatata subtus rugosa.

3. *S. VILICUS*. — *Niger, parce, breviter pilosus; thorace lateribusque pectoris flavo-subferugineis; parte coriacâ hemelytrorum medio quam*

latissime dilute sordide flavescente fasciato; membrana fuscescente-vinacea, basi flavescente. — ♀. — Long. 25 mill.; lat. 5 1/2 mill. — Cambodja (Mus. Brit.); Birmah (Coll. Stål).

Variat rostro apicem versus dilute picco.

Thorax lobo antico leviter convexo, postico dense, distincte subrugoso-punctato. Scutellum spina longa, leviter retrorsum nutante, apice dichotoma, armatum. Abdomen utrinque, præsertim ante medium, valde rotundato-dilatatum; ventre prope stigmata serie macularum minutarum albo-sericearum.

4. *S. BLENNUS.* — *Niger, pilosus; hemelytris corallinis, membrana fusco-vinacea; antennis rostroque fusco vel flavo-piccis; scutello spina longa, erecta, dichotoma armato.* — ♂. ♀. — Long. 15-20 mill.; lat. 3 1/2-4 2/3 mill. — Celebes. (Mus. Brit.)

♂. Gracilior; abdomine fusco-testaceo, medio utrinque leviter dilatato, angulis apicalibus segmentorum intermediorum in denticulum prominentibus.

♀. Abdomine nigro, medio utrinque leviter dilatato, segmentis tertio pone medium, quarto et quinto in lobum magnum, anterius altiolem, dilatatis; angulis apicalibus segmenti secundi et basalibus segmenti tertii conjunctim leviter angulato-productis.

5. *S. INDAGATOR.* — *Niger; thoracis lobo postico parteque coriacea hemelytrorum sanguineis; parte laterali dilatata abdominis sordide flavescente (vel sanguinea?), nigro-fasciata.* — ♀. — Long. 21 mill.; lat. 5 mill. — India orientalis (Coll. Stål).

Thorax lobo antico basi impresso, postico rugoso-punctato. Scutellum disco tuberculo breviter conico instructum. Hemelytra rugulosa. Abdomen utrimque nonnihil dilatatum.

ARCESIUS g. n.

Caput subcylindricum, sat gracile, longum. thorace longius, parte postoculari parte antoculari longiore. Antennæ sat longæ, graciles, articulo primo capiti saltem æquilongo. Rostrum gracile, articulo primo secundo tertia parte brevior. Thorax ante medium constrictus, lobo antico inermi, postico disco bituberculato, angulis lateralibus leviter prominulis, marginibus posterioribus leviter reflexis. Scutellum inerme. Hemelytra abdo-

minis apicem superantia. Abdomen utrinque valde rotundato-dilatatum, compressum. Pedes longiusculi, tibiis anticis femoribus trochanteribusque ad unum æquilongis.

Sycimo affine genus.

1. A. SEVERUS. — *Niger, nigro-pilosus; lobo postico thoracis, pectore ventreque in obscure fusco-testaceum vergentibus; antennis lutescentibus, articulis primo et secundo basi apicque nigris; rostri articulis secundo et tertio diluti piceis; corio ante medium flavo-livido, limbo costali lato nigricante; disco pectoris parteque basali colli dilute sordide sanguineis; membrana fusca.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 5 $\frac{1}{3}$ mill. — Insula Batschian (Mus. Brit.).

Caput thorace scutelloque ad unum paulo longius. Articulus primus antennarum thoraci æquilongus. Thorax lobo antico sat convexo, basi longitrossum impresso; angulis lateralibus lobi postici obtusiusculis.

2. A. LURCO. — *Niger, nigro-pilosus; capite, rostro, parte apicali femorum, tibiis, tarsis anoque sordide testaceo-flavescentibus; antennis lutescentibus, articulo secundo apice imo fusco; membrana sordide hyalina.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 5 $\frac{2}{3}$ mill. — Insula Waigiu (Coll. W. W. Saunders).

Præcedenti valde affinis, coloribus, capite paulo longiore, articulo primo antennarum capite nonnihil longiore, abdomine utrinque minus ampliato differt.

REDUVIUS Fabr.

1. R. LOBATUS. — *Flavo-testaceus; mucula fissa pone medium capitis, scutello, hemelytris, apice femorum omnium annulisque duobus femorum posteriorum, tibiis ante medium abdomineque nigricantibus, ventre basin versus fusco-vel flavo-testaceo, pallide flavo testaceo-consperso; apice scutelli pallido; hemelytris medio macula albo-mucorea ornatis; membrana fusco-hyalina.* — ♂, ♀. — Long. 15-17 mill.; lat. 4-4 $\frac{1}{2}$ mill. — Cambodja (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Caput thorace vix brevius, collo pone medium cylindrico. Rostrum articulo primo secundo tertia parte brevior. Antennæ articulo primo capiti thoracique ad unum æquilongo. Thorax impunctatus, lobo antico medio longitrossum impresso, utrinque convexo; lobo postico marginibus lateralibus posticis reflexis, postico recto, angulis posticis haud vel vix productis.

Abdomen segmentis duobus penultimis utrimque in lobum rotundatum majusculum singulatim dilatatis. Pedes longiusculi, subnodosi, nodulis præsertim pilosis.

2. R. PULCHRIVENTRIS. — *Violaceo-niger, nitidus, impunctatus, parce pilosus; thorace hic illic griseo-flavescente-subsericeo; hemelytris fusco-violaceis; abdomine dilute sanguineo, fasciis lateralibus et interdum maculis marginalibus nigris.* — ♂, ♀. — Long. 14-15 mill.; lat. 3 1/2-4 1/2 mill. — India orientalis borealis (Mus. Brit.).

Collum capitis pone medium cylindricum. Antennæ articulo primo thorace paulo longiore. Rostrum articulo primo secundo circiter quarta parte brevior. Thorax lobo antico et postico ante medium conjunctim longitrorsum impressis, illo utrimque convexo, hujus angulis lateralibus rotundatis, posticis retrorsum nonnihil productis, marginibus lateralibus posticis reflexis. Abdomen hemelytris nonnihil latius, utrimque leviter rotundatum.

3. R. PATAGIATUS. — *Niger, nitidus, parce pilosus; limbo latissimo laterali abdominis anoque sanguineis; antennis piccis.* — ♀. — Long. 12 mill.; lat. 3 mill. — Sarawak (Coll. Stål).

Caput gracile, thoraci æquilongum. Antennæ articulo primo capite et dimidio thorace ad unum nonnihil longiore. Rostrum articulus primus secundo nonnihil brevior. Thorax lobo antico basi leviter bituberculato, inter tubercula longitrorsum impresso; lobo postico prope angulos laterales late impresso, marginibus lateralibus posticis reflexis, angulis posticis nonnihil productis. Abdomen utrimque sat rotundato-dilatatum.

4. R. XANTHOGASTER. — *Niger, breviter pilosus; capite subtus, disco metastethii abdomineque testacco-flavescentibus.* — ♀. — Long. 12 mill.; lat. 3 1/3 mill. — Ligor Malacca (Coll. Stål).

Caput thorace subbrevius, nonnihil incrassatum. Antennarum articulus primus capite fere duplo longior. Rostrum articulus primus secundo nonnihil brevior. Thorax lobo antico et postico conjunctim longitrorsum impressis, impressione posteriori latiore et minus profunda, lobo antico utrimque convexo-elevato, lobi postici marginibus lateralibus posticis reflexis, angulis posticis vix productis. Abdomen hemelytris nonnihil latius.

5. R. GULO. — *Niger, nitidus, remote pilosus, capite subtus, thoracis lobo postico, hemelytris maculisque marginalibus abdominis tutes-*

centibus; corio apicem versus membranaque fusciscentibus, hac apicem versus dilutiore. — ♀. — Long. 41 mill.; lat. 3 mill. — Insula Mysol (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Caput thoraci subæquilongum, medio leviter incrassatum. Antennæ articulo primo capite et dimidio thorace paulo longiore. Articulus primus rostri secundo nonnihil brevior. Thorax lobo antico longitrorsum impresso, utrimque convexo-subelevato, lobo postico medio longitrorsum leviter impresso, marginibus lateralibus posticis reflexis, angulis posticis in lobulum distincte productis.

6. R. VERECUNDUS. — *Niger, nitidus; thoracis lobo postico, hemelytris, maculis duabus lateralibus mesostethii abdomineque sordide albidis; corio pone medium fusco; membrana leviter infuscata.* — ♀. — Long. 10 mill.; lat. 3 mill. — Insule Alec (Mus. Brit.).

Præcedenti valde affinis. exceptis coloribus haud differt nisi angulis posticis lobi postici thoracis haud vel vix productis, margine basali sub-sinuato.

7. R. IMPIGER. — *Sordide testacco-flavescens; capite superne, antennis fasciis duabus mediis abdominis, parte apicali femorum, tibiis tarsisque nigris.* — ♀. — Long. 10 mill.; lat. 2 1/2 mill. — Cambodja (Coll. Stål).

Antennarum articulus primus capiti et dimidio thoraci ad unum æquilongus. Rostri articulus primus secundo nonnihil brevior. Thorax lobo antico basi impresso et obtuse bituberculato, lobo postico lævi, ante medium tuberculo oblongo, leviter elevato, instructo, marginibus lateralibus posticis reflexis, angulis posticis nonnihil productis. Abdomen utrimque leviter rotundato-ampliatum. Femora prope apicem subincrassata.

8. R. MALAYUS. — *Stramineus, antennis infuscatis, dilutius annulatis; capite superne, scutello, hemelytris, abdomine, apice femorum basique tibiarum nigris; lineola media capitis, macula parva transversa corii ad basin membranæ, ventris maculis marginalibus aliisque in serie decem dispositis stramineis.* — ♀. — Long. 18 mill.; lat. 5 mill. — Malacca (Coll. Stål).

Caput gracile. Antennæ articulo primo capite duplo longiore. Thorax lævis, lobo antico medio longitrorsum impresso, utrimque convexo, lobi postici angulis posticis nonnihil productis, marginibus lateralibus posticis reflexis. Abdomen leviter dilatatum, segmentis quarto et quinto utrimque

obtuse sublobatis. Pedes subnodosi, nodulis subinfuscatis, nodulo subapicali reliquis distinctiore.

9. R. COPRIAS. — *Niger; hemelytris abdomineque sordide albidis, illorum macula media, ventris fasciis quatuor lateralibus confluentibus anoque nigris.* — ♂. — Long. 8 mill.; lat. 2 mill. — Sidney (Mus. Brit. et Coll. Stâl).

Caput incrassatum, parte ocellos ferente sat elevata. Rostrum articuli primus et secundus subæquilongi. Antennarum articulus primus capite distincte longior. Thorax lobo antico medio longitrorsum impresso, lobo postico marginibus lateralibus posticis reflexis, angulis posticis haud productis. Abdomen hemelytris nonnihil latius.

10. R. (?) MELANOCEPHALUS. — *Croceus, breviter pilosus; capite, basi ipsa excepta, antennis, rostro, dimidio postico hemelytrorum, apice femorum, tibiis tarsisque nigris; membrana violaceo-fusca; abdomine sordide stramineo, maculis sublateralibus, obsoletis, transversis fuscescentibus.* — ♂. — Long. 12 mill.; lat. 3 mill. — Insule Arc (Mus. Brit.).

Caput crassiusculum, pone oculos fere ad basin sensim gracilescens. Antennarum articulus primus thoraci et dimidio capiti ad unum æquilongus. Rostrum articuli primus et secundus æquilongi. Thorax lobo antico longitrorsum impresso, utrimque convexo, lobo postico prope angulos laterales impresso, marginibus lateralibus posticis reflexis, margine postico subrecto, angulis posticis haud productis. Hemelytra abdomine multo longiora. Abdomen hemelytris paullo latius. Pedes mediocres, haud nodosi.

11. R. HELLUO. — *Niger, pilosus; capite, rostro, articulo primo antennarum thoraceque lutescentibus.* — ♂, ♀. — Long. 17-22 mill.; lat. 4-5 1/2 mill. — Nova-Guinea et Insula Ke (Mus. Brit.).

Var. B. *Annullis duobus femorum posteriorum sordide flavescens.*

Caput thorace nonnihil brevius. Rostrum articulo primo secundo quarta parte brevior. Antennarum articulus primus capite thoraceque ad unum paulo brevior. Thorax lobo antico et postico ante medium conjunctim longitrorsum impressis, illo posteriorius ad impressionem nonnihil convexo-elevato, hujus marginibus posterioribus haud elevatis, postico recto, angulis posticis haud productis, subrotundatis. Scutellum elevatum, valde convexum. Abdomen utrimque nonnihil dilatatum. Pedes sat longi, crassiusculi, tibiis, præsertim feminarum, ante medium incrassatis.

AGYRIUS n. g.

Caput sat longum, thoraci subæquilongum, inerme. Antennæ breviusculæ, articulo primo capite subbreuiore. Rostrum gracile, articulo primo apicalibus duobus ad unum æquilongo. Thorax inerme. Scutellum triangulare, inerme. Abdomen hemelytris nonnihil latius. Pedes mediocres, femoribus anticis validis, valde incrassatis, tibiis anticis femoribus vix brevioribus, apicem versus curvatis.

Reduvio affine genus.

4. A. PODAGRICUS. — *Dilute sanguineus; capite, rostro, antennis, parte apicali femorum, tibiis tarsisque nigris; membrana fusco-violacea.* — ♂, ♀. — Long. 15 mill.; lat. 4 mill. — Sarawak (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Thorax rugosus, lobo antico basi quadrutuberculato, postice medio impresso; lobo postico antierius rugis quinque longitudinalibus instructo, disco pone medium utrimque subtuberculato, inter tubercula transversim subrugoso, angulis lateralibus rectis, leviter prominulis, posticis nonnihil retrorsum productis, marginibus lateralibus posticis reflexis. Tegmina rugosa.

HAGIA g. n.

Caput thorace brevius, inerme, basi constrictum. Rostrum crassiusculum, articulo primo basin versus graciliore, duobus apicalibus ad unum æquilongo. Antennæ mediocres, articulo primo thoraci nonnihil longiore. Thorax inerme, lobis duobus conjunctim longitrorsum late impressis, lobi postici angulis lateralibus haud prominulis, obtusatis, angulis posticis haud productis. Scutellum inerme, triangulare, convexiusculum. Abdomen hemelytris paullo latius. Pedes mediocres, tibiis anticis femoribus trochanteribusque ad unum paullo longioribus, rectis.

Reduvio affine genus.

1. H. PUNCTORIA. — *Dilute sanguinea; antennis, macula discoidali lobi postici thoracis, scutello, hemelytris, excepto limbo costali, maculis duabus lateralibus pectoris, vitto laterali ventris pedibusque, exceptis coxis trochanteribusque, nigricantibus.* — ♀. — Long. 14 mill.; lat. 4 1/2 mill. — Sarawak (Mus. Brit.).

2. H. LATICLAVIA. — *Dilute sanguinea; antennis, rostro, lobo antico*

thoracis, scutello, hemelytris, excepto limbo lato costati, maculis duobus lateralibus vel lateribus pectoris, maculis lateralibus ventris, interdum in vittam confluentibus, ano pedibusque nigris; tarsis flavo vel fusco-testaceis. — ♂. — Long. 13 1/2-16 mill.; lat. 3 1/2-4 mill. — Insule Philippinenses (Mus. Brit.).

3. II. DISCOPHORA. — Dilute sanguinea; capite, antennis, rostro, macula maxima lobi postici thoracis, scutello pone medium, hemelytris, basi limboque costati exceptis, lateribus pectoris, ventris vitta laterali pone medium, ano pedibusque, exceptis coris trochanteribusque, nigris. — ♂. — Long. 13 1/2 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Insula Mysol (Coll. Stål).

COLLIOCORIS Halm.

1. C. ERYTHRÆUS. — Sordide luteus; rostri articulis duobus apicalibus membranaque nigro-fuscis. — ♀. — Long. 16 mill.; lat. 4 mill. — Nova-Hollandia (Mus. Brit.).

Congenericis major, omnino aliter coloratus. Antennæ articulo primo capite subbreviore. Thorax medio constrictus, lobo postico distincte rugoso-punctato, angulis lateralibus rotundatis, posticis haud productis. Scutellum apice tuberculo subconico, retrorsum nutante, instructum.

NICRUS g. n.

Corpus nonnihil depressum, granulatum, setulosum. Caput longiusculum, cylindricum. Rostri articulus primus brevis, secundus illo plus ter longior. Antennæ articulo primo capite subbreviore. Thorax inermis. Scutellum triangulare, apice acute productum. Abdomen hemelytris nonnihil latius. Pedes breviusculi, subgraciles, tibiis anticis femoribus trochanteribusque ad unum æquilongis.

Havintho affine genus.

1. II. EUMORPHUS. — Cinnabarinus; antennis, capite pone oculos, rostri articulis duobus apicalibus, basi scutelli, membrana, pectore, parte apicali abdominis, apice femorum anteriorum, femoribus posticis, basi excepta, tibiis tarsisque carulco-nigris. — ♀. — Long. 12 mill.; lat. 2 1/2 mill. — Morton Bay (Mus. Brit.).

PANTHOUS g. n.

Caput oblongum, inerme. Antennæ mediocres, articulo primo capite circiter duplo longiore. Rostrum articulo primo secundo nonnihil brevius. Thorax hemelytris latior, lobo antico parvo, postico magno, posterius dilatato et retrorsum supra scutellum et basin hemelytrorum producto. Pedes mediocres, interdum subnodulosi, tibiis anticis femoribus paullo longioribus.

Reduvio affine, structura singulari thoracis insigne, genus.

1. P. EXCELLENS. — *Flavescens, lævis, nitidus, parce pilosus; capite superne, apice excepto, antennis, lobo antico thoracis, excepto margine antico, pectore maximam ad partem, maculis maximis transversis lateralibus ventris pedibusque nigris, coxis trochanteribus basique femorum flavescens; limbo abdominis sordide sanguineo; apice corii membranaque fuscis.* — ♀. — Long. 29 mill.; lat. 7 mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

Thorax lobo antico medio longitrorsum impresso, lobo postico latitudine nonnihil brevius, marginibus lateralibus posticis late reflexis, subrectis, parte pone angulos laterales parte anteriore duplo longiore. Hemelytra abdomen haud superantia. Pedes breviusculi, subnodulosi, femoribus anticis nonnihil incrassatis.

2. P. D.EDALUS. — *Rufescens-testaceus; capite, antennis, rostro, hemelytris, tibiis ab apice ultra medium, tarsis plagaque maxima laterali ventris nigris; annulis duobus articuli primi antennarum flavescens.* — ♀. — Long. 27 mill.; lat. 7 mill. — Malacca (Coll. Stål).

Thorax lobo antico medio impresso, tuberculis pluribus instructo, lobo postico disco rugoso, angulis lateralibus rectis, prominentibus, marginibus lateralibus posticis reflexis, ante medium sinuatis, postice in parte producta tuberculo magno transverso instructo. Pedes breviusculi, subnodulosi.

3. P. ICARUS. — *Sordide rufescens-testaceus, antennis abdomineque nigris, illorum articulis basi annuloque testaceis; thorace distincte subgranulato-rugoso, postice in parte producta tuberculo magno, sat elevato, instructo; pedibus breviusculis, subnodosis.* — ♀. — Long. 20 mill.; lat. 5 mill. — Malacca (Coll. Stål).

Præcedenti valde affinis, coloribus, thorace distincte rugoso tuberculoque hujus postico magis elevato differt.

4. P. OCHROMELAS. — *Niger; thoracis lobo postico, macula parva laterali mesostethii hemelytrisque flavescens, corii apice membranaque nigro-fuscis.* — ♂. — Long. 9 mill.; lat. 2 1/2 mill. — Nova-Guinea, Dorei (Mus. Brit.).

Præcedentibus multo minor, gracilior, pedibus longioribus, gracilioribus, haud nodulosis, femoribus anticis haud incrassatis. Thorax lobo antico longitrorsum impresso, utrimque convexo, lobo postico postice subsinuato. Hemelytra abdomine multo longiora. Abdomen hemelytris vix latius.

TEGEA n. g.

Corpus sat crassum. Caput thorace brevius, pone oculos incrassatum, basi ipsa constrictum, ante oculos subconico-productum. Rostrum gracillimum, articulo primo brevissimo, secundo longissimo. Antennæ breves, articulis duobus apicalibus brevissimis. Thorax anteriora versus levissime constrictus, inermis. Scutellum triangulare. Abdomen hemelytris paulo latius. Pedes breviusculi, crassiusculi, tibiis anticis elongatis, femoribus longioribus.

Lophoccephalæ affine genus.

1. T. ATRO-PICTA. — *Sanguinea, brevissime pilosa; capite superne ante oculos, antennis, thoracis fascia media vittaque posteriore, scutello, clavo, limbo interno corii, membrana, pectore, fasciis ventris, ano, coxis parte dimidia apicali femorum, tibiis tarsisque nigris.* — ♂. — Long. 9 mill.; lat. 3 mill. — Sidney (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Thorax disco longitrorsum late et retrorsum sensim latius impressus ad impressionem obtuse subelevatus, lobo postico latera versus late impresso, angulis lateralibus rotundatis, posticis obtusis, leviter productis, marginibus lateralibus posticis rectis.

2. T. PULLATA. — *Nigra, pilosula; coxis, trochanteribus posterioribus, basi femorum posteriorum abdomineque sordide flavescens, hujus limbo maculis parvis nigris ornato.* — ♂, ♀. — Long. 12 mill.; lat. 4 mill. — Java (Mus. Brit.).

Statura præcedentis. Thorax disco impressus, carinis duabus longitudinalibus distinctis, ante medium approximatis, medio subito divergentibus.

pone medium parallelis, instructus; lobo postico utrimque ante medium carina transversa instructo, marginibus reflexis, lateralibus posticis.

EPIRODERA Westw.

1. *E. PALLIDIROSTRIS*. — *Fusco-testacea, antennis, rostro, maculis marginalibus abdominis, vitta laterali ventris, annuloque femorum sordide testaceo-flavescentibus*. — ♂. — Long. 9 mill.; lat. 3 mill. — Insula Mysol (Coll. Stål).

E. notata affinis, coloribus, thoracis lobo antico minore, lobo postico haud longiore et eodem nonnihil angustiore, angulis posticis lobi postici minus productis.

CANTHESANGUS Am. et Serv.

1. *C. HELLUO*. — *Grisco-stramineus; vitta angusta capitis, per thoracem continuata, hujus etiam spinis limbisque lateralibus et postico lobi postici, scutello, clavo, hemelytrorum maculis tribus, una parva transversim subtriangulari, postice sinuata, ad medium clavi posita, altera media, magna, subquingulari, basin membranæ et partem corii occupante, tertia in media membrana prope apicem corii posita, irregulari, latitudine haud vel parum longiore, margines lateralis anæ basalis mediæ membranæ attingente, postice in angulum acutiusculum producta, femoribus, parte basali apiceque exceptis, tibiis anterioribus superne ad partem, annulis duobus versus basin apiceque tibiarum posticarum nigricantibus, harum articulo basali thorace vix longiore*. — ♀. — Long. 27 mill.; lat. 5 mill. — Ceylan (Mus. Brit.).

2. *C. GULO*. — *Grisco vel subferrugineo-stramineus; linea media capitis, per thoracem continuata, hujus etiam spinis marginibusque lateralibus et postico, hemelytrorum clavo maculisque tribus, una basin versus posita, parva, subtriangulari, altera media, subquingulari, tertia in media membrana prope apicem corii posita, subtriangulari, intus rotundata, latitudine nonnihil longiore, antice quam postice magis producta, nigricantibus; parte dimidia apicali femorum posticorum, annulo latissimo subapicali femorum intermediorum, apice tibiarum omnium, anticarum etiam basi vittisque duabus fuscis; antennis nigris, articulis primo et secundo basin versus grisco-stramineis, illo thorace et dimidio capite ad unum paullo brevioribus*. — ♀. — Long. 29 mill.; lat. 5 mill. — Pulo Penang (Mus. Brit.); Malacca (Coll. Stål).

Differunt hæ duæ species a *C. trimaculato* forma macularum duarum posteriorum hemelytrorum; longitudo articuli primi antennarum inter notas optimas specificas in hoc genere numeranda.

3. *C. LURCO*. — *Griseo-stramineus*; *antennis, excepta basi articulorum primi et secundi, linea capitis per thoracem continuata, hujus etiam spinis, hemelytrorum clavo maculisque tribus, una parva triangulari, longitudinali, prope basin posita, altera media irregulari, latitudine longiore, tertia elongata, retrorsum angustata, per fere totam longitudinem venæ exterioris arcæ mediæ membranæ extensa, annulisque tibiæ nigro-fuscis*; articulo primo antennarum thoraci æquilongum. — Long. 24 mill.; lat. 4 1/3 mill. — Hongkong (Mus. Brit.).

C. trimaculato omnium hic descriptarum specierum proximus, macula media hemelytrorum haud triangulari, postice haud truncata, macula posteriore angustiore, haud obtriangulari, differt.

4. *C. PRÆDO*. — *Fusco-testaceus*; *hemelytris, antennis, rostro pedibusque griseo-stramineus, illis fusco-conspersis*; *clavo maculisque tribus hemelytrorum, una parva prope apicem clavi, altera media, magna, irregulari, postice acute producta, tertia in arcæ mediæ membranæ posita, parva, nigro-fuscis*; *annulis antennarum, medio femorum annulisque tibiæ fuscis*; *antennarum articulo primo capiti et dimidio thoraci ad unum subæquilongo*. — ♂. — Long. 22 mill.; lat. 4 mill. — Insulæ Philippinenses (Mus. Brit.).

VILIUS g. n.

Caput sat magnum, crassum, paulo pone oculos subito constrictum, parte ocellos ferente sat elevata, collo brevi. Oculi, præsertim apud marem, sat prominuli. Antennæ quadriarticulatæ, pilosæ (♂) vel nudæ (♀), articulo primo capite paulo longiore (♂) vel eidem æquilongo, articulo secundo basali nonnihil longiore. Rostrî articulus secundus basali multo longior. Thorax ante medium constrictus, medio et prope angulos posticos longitrossum impressus. Scutellum transversum, apice late truncatum. ibidem utrimque et prope basin utrimque dente curvato armatum. Pedes graciles, femoribus vix incrassatis; tibiis anterioribus fossa spongiosa minuta instructis; articulo apicali tarsorum posteriorum basalibus duobus ad unum æquilongo; basali brevissimo.

Mendi affine genus.

1. *V. MELANOPTERUS*. — *Corallinus, nitidus, lævis*; *antennis, hemelytris,*

excepto limbo costali, pedibusque fusco-testaceis; ventre remote punctato, incisuris lævibus (♂) vel punctatis (♀). — ♂, ♀. — Long. 18 mill.; lat. 4 1/2 mill. — Silhet (Mus. Brit.).

Var. *B. Maculis lateralibus ventris nigro-fuscis.*

MENDIS Stål.

1. *M. PECTORALIS.* — *Corallinus; antennis, impressionibus transversa et longitudinali media thoracis, basi discoque scutelli, hemelytris, excepto limbo costali, basi apiceque dilatato, pectore ventrisque maculis laterali-bus, in seriem dispositis, nigris. — ♂. — Long. 13 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Shanghai (Mus. Brit.).*

Thoracis impressio longitudinalis media incisuræque ventrales carinulis transversis instructæ.

ADRANIA g. n.

Corpus elongatum. Caput pone oculos leviter incrassatum, parte ocellos ferente vix elevata, collo brevissimo. Rostrum articulo primo articulis duobus apicalibus ad unum nonnihil longiore. Antennæ septem articulatæ, corpore dimidio nonnihil longiores, apicem versus gracilescentes, pilosæ, articulo primo capite æquilongo, secundo primo nonnihil longiore. Thorax medio constrictus, lobo antico in medio, lobo postico prope angulos laterales longitrorsum impressi. Scutellum retrorsum angustatum, apice mucronibus duobus curvatis, parum distantibus, armatum. Pedes medio-cres, femoribus anterioribus leviter incrassatis, inermibus, fossa spongiosa tibiæ anteriorum parva; tarsorum posteriorum articulo apicali basalibus duobus ad unum paulo longiore.

Scadræ affine genus, antennis septem articulatis, structura rostri corporeque elongato differt.

1. *A. MACRA.* — *Obscure cinnamomea, antennis pedibusque dilutioribus; membrana fusca; maculis marginalibus abdominis, coxis trochanteribusque flavo-albidis. — ♂. — Long. 13 mill.; lat. 3 mill. — Insula Waigiû (Mus. Brit. et Coll. W.-W. Saunders).*

SCADRA Stål.

1. *S. MACULIVENTRIS.* — *Corallina; antennis, basi scutelli, hemelytris, excepto limbo costali, basi apiceque dilatato, meso et metastethiis, maculis*

ventris, in series tres dispositis, pedibusque nigris; maculis quatuor thoracis æneo-nigris, hujus impressionibus minus. — ♀. — Long. 11 mill.; lat. 3 mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

PIRENA g. n.

Caput pone oculos incrassatum, basi subito constrictum, collo brevissimo, parte ocellos ferente haud elevata. Rostris articulus primus secundo vix duplo longior. Antennæ breves, crassiusculæ, sexarticulatae, articulo secundo basali duplo longiore. Thorax medio constrictus, medio et prope angulos posteriores longitrorsum impressus. Scutellum transversum, apice late truncatum et utrinque dente armatum. Pedes breviusculi, femoribus nonnihil incrassatis, subtus spina una distincta aliaque minuta armatis; fossa spongiosa tibiæ anteriorum parva; tarsis posticis articulo apicali basalibus duobus nonnihil longiore.

Ectrichodia affine genus, antennis brevibus, crassiusculis formaque scutelli distinctum.

1. P. PUNCTATA. — *Obscure carulea; macula media hemelytrorum sordide albida; maculis marginalibus abdominis flavis; thoracis lobo postico subtiliter ruguloso, lobo antico ventreque fortiter punctatis.* — ♀. — Long. 9 mill.; lat. 2 mill. — Port Natal (Mus. Brit.).

ANTIOPA g. n.

Corpus parvum. Caput crassum, supra subtusque convexum, præsertim pone oculos incrassatum, basi subito constrictum, parte ocellos ferente vix elevata. Oculi parum prominuli. Rostrum articulis primo et secundo subæquilongis. Antennæ breves, articulo primo capite brevior. Hujus apicem tamen nonnihil superante, secundo basali nonnihil longiore. Thorax ante medium constrictus, disco et prope angulos laterales longitrorsum impressus. Scutellum leviter transversum, mucronibus apicalibus late distantibus. Pedes breviusculi, femoribus anticis reliquis crassioribus, inermibus, fossa spongiosa tibiæ anteriorum parva; tarsis posticis articulo apicali basalibus duobus ad unum paulo longiore.

Ectrichodia affine genus, antennis brevibus, crassioribus, capitique forma præsertim distinctum.

1. A. PUMILA. — *Corallina; antennis, pedibus hemelytrisque nigro-fuscis, illorum articulis duobus apicalibus albidis, horum limbo costati*

corallino; segmento dorsali ultimo abdominis, lateribus segmentorum duorum apicalium, parte postica segmenti ultimi ventris anoque nigris; impressionibus thoracis incisurisque ventris transversim carinulatis. — ♀. — Long. 8 mill.; lat. 2 mill. — Ceylan (Mus. Brit.).

CECINA g. n.

Caput pone oculos leviter incrassatum, in collum distinctum sensim transiens, parte ocellos ferente distincte elevata. Oculi prominentes. Rostrum longiusculum, articulo primo apicalibus duobus ad unum paullo brevior. Antennæ saltem sexarticulatae, articulo primo capite sublongiore, secundo illo nonnihil brevior. Thorax lobo antico elevato, medio producto, granulato et spinuloso. Scutellum transversum, mucronibus apicalibus late distantibus. Pedes graciles, inermes; tibiis anterioribus fossa spongiosa destitutis.

Genus *Ectrichodidum* omnium mihi cognitorum maxime insigne, *Mendi* affine.

1. *C. SPINULOSA*. — *Pilosa, sordide corallina; hemelytris, limbo costali excepto, infuscatis; thoracis lobo antico breviter spinuloso, marginibus spinis distinctioribus ciliatis, parte producta, prope apicem obtuse contracta, apice sinuata, et ibidem utrimque spina terminata, lobo postico rugoso-punctulato: incisuris ventris carinulis transversis, segmentis prope apicem serie transversa punctorum majusculorum instructis.* — ♂. — Long. 10 mill.; lat. 2 1/2 mill. — Cambodja (Mus. Brit.).

CENTROCNEMIS Sign.

1. *C. SIGNORETI*. — *Parce granulata, sordide flavo-testacea; antennis, excepto articulo primo, apice spinarum maculisque irregularibus discoïdalibus lobi postici thoracis, maculis compluribus confluentibus hemelytrorum, fasciis duabus latis femorum posteriorum, fasciâ lata media parteque apicali tibiârum nec non disco maculisque confluentibus ventris, in series duas laterales dispositis, nigricantibus.* — ♂, ♀. — Long. 26 mill.; lat. 7 mill. — Sarawak (Mus. Brit. et Coll. Stål).

C. Deyrollei affinis, multo remotius et obsoletius granulata, collo spinisque capitibus longioribus, spinis lobi antici thoracis antrorsum nutantibus, lobi postici parte laterali producta spinis magis tribus, nec quatuor,

armata, spina apicali segmentorum abdominis validiore, haud duplicata, picturaque distinctissima.

PLATYMERIS Am. et Serv.

1. P. PRÆDO. — *Nigricans, subtus fusco-testacea; limbo abdominis dilute sanguineo; pedibus flavo-testaceis, annulo prope apicem femorum nigro-fusco.* — ♀. — Long. 29 mill.; lat. 8 mill. — Sierra Leona (Mus. Brit.).

Congenericis minor, aliter picta, pedibus gracilioribus. Thorax lobo postico lævi, angulis lateralibus spinula subrecurva armatis. Scutellum apice acuto et leviter reflexo, basi utrimque tuberculo distincto marginali instructum. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum circiter dimidium tiliarum occupans.

ACANTHASPIS Am. et Serv.

I. *Articulo primo antenarum capitis apicem superante.*

1. A. FULVIPES. — *Nigricans; macula basali et majore orbiculari media corii nec non maculis transversis marginalibus abdominis sordide flavescens apice femorum, tibiis tarsisque testaceis.* — ♂, ♀. — Long. 2¼ mill.; lat. 6 mill. — Silhet (Mus. Brit.); Dekan (Coll. Stål).

A. bistillata maxime affinis, maculis marginalibus abdominis mox distinguenda. Thorax lobo postico obsolete rugoso, angulis lateralibus leviter retrorsum acute spinoso-productis, postice tuberculis duobus parvis acutiusculis armato. Spina scutelli nonnihil recurva.

2. A. RUGULOSA. — *Nigricans; macula magna media corii flavescens.* — ♀. — Long. 18-20 mill.; lat. 5-5½ mill. — India orientalis, Bengalia (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Statura *A. tergeminæ*. Thorax lobo postico distincte ruguloso, angulis lateralibus acutis. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum circiter tertiam partem longitudinis tiliarum occupans. Articulus tertius tarsorum posticorum basalibus duobus ad unum nonnihil brevior, primus secundo dimidio brevior.

3. A. PICINA. — *Nigro-picea; tibiis tarsisque dilutius piceis; macula magna media corii maculisque marginalibus abdominis sordide str-*

mineis. — ♀. — Long. 23 mill.; lat. 5 1/2 mill. — Patria ignota (Mus. Brit.).

A. rugulosa affinis, major, thoracis lobo postico distincte rugoso, postice tuberculis duobus obtusissimis obsolete instructo. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum duas quintas partes tiliarum occupans. Tarsi postici uti in *A. rugulosa*.

4. *A. SIGNIFERA*. — *Fusco-testacea, supra cum antennis, annulo prope apicem basique femorum, tibiis, tarsis limboque abdominis sordide flavo testaceis, hoc nigro-maculato; maculis lobi antici, limbo basali, maculis tribus discoidalibus, in maculam majorem, late ovalem, subconfluentibus, lituraque laterali lobi postici thoracis, scutello, excepta spina, clavo fere toto, disco apiceque corii, exceptis venis, nigricantibus; membrana fusca, pallido-venosa*. — ♀. — Long. 18 mill. lat. 5 mill. — Ligor Malacca (Coll. Stål).

Thorax lobo postico distincte ruguloso, angulis lateralibus spinosis, spinis nonnihil recurvis. Spina scutelli longa, adscendens. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum tertiam partem tiliarum occupans. Tarsi postici articulo apicali basalibus duobus ad unum paullo brevioribus, secundo basali fere plus duplo longiore.

5. *A. GULO*. — *Nigra, supra cum capite limboque abdominis sordide dilute sanguinea; macula parva postoculari capitis, maculis tribus, antice confluentibus, margineque postico lobi postici thoracis, scutello; macula maxima communi ante medium hemelytrorum, apice corii membranaque nigris*. — ♀. — Long. 18 mill.; lat. 5 mill. — Ligor Malacca (Coll. Stål).

Thorax lobo postico rugoso, postice tuberculis duobus parvis distinctis instructo, angulis lateralibus acute spinoso-productis. Scutelli spina longa, acuta, oblique adscendens. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum plus quam tertiam partem tiliarum occupans. Tarsi postici articulo apicali basalibus duobus ad unum paullo brevioribus, secundo basali ter longiore.

6. *A. HELLUO*. — *Niger; angulis lateralibus maculisque duabus basalibus lobi postici thoracis, basi maculaque transversa subarcuata pone medium corii, maculis marginalibus abdominis, apice femorum, tibiis tarsisque dilute sordide sanguineis; tibiis basin versus infuscatis*. — ♂. — Long. 20 mill.; lat. 5 1/2 mill. — Sylhet (Mus. Brit.).

Thorax lobo postico remote aciculato, postice tuberculis duobus obtusis parvis instructo, angulis lateralibus acutiusculis, prominulis. Spina scu-

telli longa, nonnihil ascendens. Fossa spongiosa tibiæ anteriorum duas quintas partes tibiæ occupans. Tarsi postici articulo apicali basalibus duobus ad unum æquilongis, secundo basali duplo longiore.

7. A. LURCO. — *Flavescente-testacea; hemelytris nigricantibus, corii macula parva obsoleta subbasali atque majore rotundata media flavo-testaceis.* — ♀. — Long. 24 mill.; lat. 5 mill. — Port Natal (Mus. Brit.).

Thorax lobo postico ruguloso, angulis lateralibus in spinulam productis. Scutellum apice spina leviter ascendente armatum. Fossa spongiosa tibiæ anteriorum quartam vel quintam partem tibiæ occupans. Tarsi postici articulis duobus apicalibus æquilongis, basali brevissimo.

8. A. PEDESTRIS. — *Fuscescente-testacea, pedibus antennisque pallidioribus in flavo-testaceum vergentibus; carinis obtusis lobi antici, muculis duabus angulisque lateralibus lobi postici thoracis fuscis; maculis marginalibus abdominis flavo-testaceis; hemelytris rudimentariis, minutissimis, flavescentibus.* — ♀. — Long. 13 1/2 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Madras. (Mus. Brit.)

Thorax lobo postico ruguloso, brevi, angulis lateralibus acutiusculis. Scutellum apice haud productum, leviter reflexum. Abdomen latiusculum. Fossa spongiosa tibiæ anteriorum duas quintas partes tibiæ occupans. Tarsi postici articulo apicali basalibus duobus vix brevioribus.

9. A. (?) TENEBROSA. — *Nigra; thoracis lobo postico testaceo.* — ♂, ♀. — Long. 14 mill.; lat. 3 1/2 mill. — China borealis (Mus. Brit.).

Thorax lobo postico ter longitrorsum impressus, inermis, angulis lateralibus rotundatis. Scutellum apice retrorsum breviter spinoso-productum. Abdomen hemelytris paulo latius. Pedes graciles, fossa spongiosa tibiæ anteriorum circiter duas quintas, partes tibiæ intermediarum circiter quartam partem tibiæ occupans. Articulus apicalis tarsorum posteriorum basalibus duobus ad unum nonnihil brevioribus.

10. A. CONCINNULA. — *Nigra, longe pilosa; antennis, thoracis lobo postico, corio, limbo abdominis pedibusque stramineis; apice articuli primi, medio et apice articuli secundi antennarum, basi, apice, margine interiore lineaque media corii, maculis parvis marginalibus abdominis, basi apiceque femorum, basi, apice annuloque tibiæ nigris.* — ♂. — Long. 9 mill.; lat. 2 1/2 mill. — Dekan (Coll. Stål).

Caput subincrassatum. Antennæ articulo basali capite paulo brevioribus,

hujus apicem tamen longe superante. Thorax lobo postico angulis lateralibus acutis, leviter retrorsum vergentibus. Scutelli spina subreflexa. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum brevi. parva.

II. *Articulo basali antennarum brevi, capitis apicem haud vel vix superante.*

11. A. BIGUTTULA. — *Nigricans; macula subovali media corii maculisque marginalibus abdominis sordide stramineis.* — ♀. — Long. 9 1/2 mill.; lat. 3 mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

Caput crassiusculum. Thorax lobo postico inermi, angulis lateralibus vix prominulis, rotundatis. Scutellum apice acute productum. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum duas quintas partes tiliarum occupans. Tarsi postici articulo basali duobus apicalibus ad unum nonnihil brevior, secundo basali duplo longiore.

12. A. SABULOSA. — *Nigra; capitis maculis superioribus, apice scutelli, basi maculaque pone medium corii, angulo basali membranae, maculis marginalibus abdominis, coxis, trochanteribus, apice femorum, basi annulisque duobus tiliarum nec non tarsis, flavo-testaceis.* — ♂. — Long. 10 mill.; lat. 3 mill. — Nova-Hollandia (Mus. Brit.).

Caput crassum, pone oculos incrassatum. Antennarum articulus primus capitis apicem subattingens. Thorax remote granulatus, lobo postico inermi, angulis lateralibus rotundatis, margine basali ante scutellum recto. Scutellum apice productum. Fossa spongiosa tiliarum anteriorum parva. Articulus primus tarsorum posteriorum basalibus duobus ad unum subæquilongus.

CHERONEA g. n.

Caput crassiusculum, pone oculos sat incrassatum, basi subito constrictum. Antennæ breviusculæ, articulo primo capite nonnihil brevior, hujus apicem tamen nonnihil superante. Rostrum crassiusculum, articulo primo apicalibus duobus ad unum subæquilongo. Thorax medio constrictus, basi late rotundatus. Scutellum apice productum. Pedes breviusculi, tibiis anterioribus fossa spongiosa destitutis, anticis apice nonnihil productis, subtus spinulosis; tarsis posticis articulo apicali basalibus duobus nonnihil longiore.

Acanthaspidi affine genus.

1. C. QUÆRULA. — *Nigra; thoracis lobo postico, exceptis margine an-*

tico impressioneque media, corvis, trochanteribus, dimidio basali femorum nec non ano feminae flavo-testaceis. — ♂, ♀. — Long. 9 mill.; lat. 3 mill. — Insula Mysol (Mus. Brit et Coll. W. W. Saunders).

Caput crassum, pone oculos incrassatum, basi constrictum. Antennæ articulo primo capite brevior. hujus apicem tamen nonnihil superante. Thorax inermis, lobo postico lævi, impressione distincta longitudinali posteriorius abbreviata instructo, angulis lateralibus rotundatis. Scutellum apice leviter productum, haud reflexum. Venæ hemelytrorum fusco-tomentosa.

PSOPHIS g. n.

Caput subgracile, pone oculos retrorsum sensim gracilescens. Oculi ante medium capitis positi. Rostrum gracile, articulo primo apicalibus duobus ad unum æquilongo. Antennæ articulo primo brevi, capite dimidio brevior, hujus apicem tamen nonnihil superante. Thorax medio constrictus. Pedes graciles, tibiis fossa spongiosa destitutis. Tarsi postici articulis omnibus elongatis.

Acmthaspidi affine genus.

1. P. ERYTHRÆA. — *Subsericea, dilute sanguinea; macula communi prope basin hemelytrorum, membrana tibiisque, basi excepta, nigro-fuscis.* — ♂. — Long. 9 mill.; lat. 2 1/2 mill. — India orientalis borealis (Mus. Brit.).

Thorax lobo postico lævi, angulis lateralibus rotundatis. Scutellum apice leviter recurvum. Tibiæ posticæ prope basin leviter incrassatæ.

INARA Stål.

1. I. ALBO-GUTTATA. — *Obscure carulea, nitida, lævis, parce pilosa; spina scutelli, excepto apice, pedibusque rufescente-testaceis; vitta supra apicali femorum anteriorum, vitta basali tibiarum anticarum, tibiis posterioribus tarsisque nigro-fuscis; corio apicem versus nigro, opaco, ibidem macula alba notato; membrana nigricante.* — ♀. — Long. 15 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Singhiapor (Mus. Brit. et Coll. W. W. Saunders).

I. *flavo-pictæ* quoad staturam simillima, coloribus maxime diversis, collo spinisque lateralibus thoracis longioribus distinctissima.

CERHLOCUS Stål.

1. C. VULNERANS. — *Griseo-stramineus*; *vittula capitis ante et pone oculos, linea obliqua laterali lobi antici thoracis, antice reflexa et cum opposita conjuncta, lineaque transversa arcuata lobi postici, apice femorum, tibiis tarsisque nec non maculis sublateralibus ventris anoque nigro-fuscis*; *femoribus fusco-annulatis*; *tibiis sordide stramineo-biannulatis*; *hemelytris fusciscentibus, basi, macula magna media apiceque corii griseo-stramineis*. — ♂. — Long. 16 mill.; lat. 4 $\frac{1}{3}$ mill. — Sarawak (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Thorax lobo antico disco quadri-subtuberculato, lobo postico posteriori tuberculis duobus distinctis instructo, angulis lateralibus subacutis, levissime prominentibus. Scutellum postice productum, levissime reflexum, apice imo nigro. Fossa spongiosa tibiaram anteriorum circiter duas quintas partes tibiaram occupans.

2. C. EXSUGIENS. — *Nigricans*; *thoracis lobo postico posteriori rostroque piccis*; *vittis duabus abbreviatis corii albidis*; *limbo abdominis, tibiis tarsisque testaceo-flavescentibus, tibiis superne infuscatis*. — Long. 15 mill.; lat. 4 mill. — Insula Waigiu (Coll. W. W. Saunders).

3. C. (?) VARIANS. — *Nigro-fuscus, pilosulus*; *basi maculaque pone medium hemelytrorum flavo-testaccis*. — ♀. — Long. 20 mill.; lat. 5 mill. — Nova-Hollandia (Mus. Brit.).

Var. B. *Rostro, maxima parte lobi postici thoracis, disco limboque ventris nec non pedibus flavo-testaccis*.

Thorax inermis, lobo postico medio et prope latera longitrorsum leviter impresso, angulis lateralibus rotundatis. Scutellum apice acute productum et leviter reflexum. Fossa spongiosa tibiaram anteriorum vix tertiam partem tibiaram occupans.

OPSICOETUS Klug.

1. O. MULTISPINUS. — *Nigricans, spinis thoracis, scutelli et abdominis, hujus etiam limbo testaccis*; *parte basali femorum tibiisque posticis sordide griseo-flavescentibus*. — ♀. — Long. 18 mill.; lat. 4 mill. — Sidney (Mus. Brit. et Coll. Stål).

Thorax lobo antico spinis sex longis (2.2.2.) armato, mediis approximatis, lobo postico ruguloso, angulis posticis spina longa nonnihil retrorsum et sursum vergente armatis. Spina scutelli oblique adscendens. Abdomen segmentis primo, secundo et tertio apice utrimque spina armatis. Fossa spongiosa tibiæ anteriorum fere plus quam duas quintas partes tibiæ occupans.

SMINTHUS Stål.

1. *S. GRATIOSUS*. — *Rufo-testaceus; capite, thoracis lobo postico anterioris et antico toto, hemelytris, pectoris lateribus, ano apiceque femorum nigris; antennis fusco-testaceis; thoracis impressionibus tribus longitudinalibus linearibus, distinctissimis.* — ♂. — Long. 16 mill.; lat. 3 1/2 mill. — Tondano (Coll. W. W. Saunders).

OPINUS Am. et Serv.

1. *O. PUNCTORIUS*. — *Niger; thorace, scutello, pectore, disco ventris, coxis trochanteribusque testaceis.* — ♀. — Long. 12 mill.; lat. 3 mill. — Insula Waigiu (Coll. W. W. Saunders).

TIARODES Am. et Serv.

1. *T. PUSTULATUS*. — *Subcæruleo-niger, nitidus; macula rotundata media corii sordide flavo-albida; maculis tribus marginalibus dorsalibus abdominis, ventre, exceptis segmentis duobus apicalibus maculisque marginalibus, nec non femoribus cinnabarinis, his apice nigris.* — ♀. — Long. 28 mill.; lat. 7 1/2 mill. — Insula Batschian (Coll. W. W. Saunders).

2. *T. VARICOLOR*. — *Nigro-æneus, nitidus; rostro, abdomine pedibusque sanguineis; antennis segmentoque anali nigris.* — ♂. — Long. 28 mill.; lat. 5 mill. — Insule Philippinenses (Mus. Brit.).

Var. A. *Hemelytris totis nigris.*

Var. B. *Hemelytris sanguineis, membrana nigra, margine basali flavo-testaceo.*

T. versicolori affinis; exceptis coloribus ab illo vix differt.

3. *T. ELEGANS*. — *Nigro-cyanus; rostro, hemelytris, pedibus abdomineque sanguineis, hujus segmento ultimo anoque nigro-cyanis; membrana,*

basi excepta, nigro-fusca. — ♂, ♀. — Long. 18 mill.; lat. 4 mill. — Ceylan (Mus. Brit.).

SPINIGER Burm.

4. S. ALCIDES. — *Niger; articulo secundo antenarum, basi apiceque exceptis, apiceque membranæ albidis; corii vena longitudinali basi et medio sordide flavo-albida.* — ♀. — Long. 25 mill.; lat. 6 mill. — Amazon (Mus. Brit.).

Thorax lobo antico disco spinis duabus longissimis et utrimque tuberculo distincto armato; lobi postici angulis lateralibus spina longissima, retrorsum et sursum vergente, armatis. Scutellum spina longissima, spinis thoracis longiore, suberecta armatum. Femora inermia.

PIRATES Serv.

1. P. CYANEUS. — *Parce pilosus, obscure cyaneus; antennis fusco-testaceis; hemelytris nigro-fuscis, vitta apicali clavi, macula parva anguli interioris corii maculæque prope basin membranæ albidis; pedibus posticis tarsisque flavo-testaceis.* — ♂. — Long. 22 mill.; lat. 5 mill. — India orientalis (Mus. Brit.).

Caput ante oculos sat longe productum, lobo antico thoracis vix longius. Thorax pone medium valde constrictus, lobo antico postico fere duplo longiore et multo angustiore. obsolete punctulato, linea longitudinali media impressa. Scutellum apice paulo productum, leviter reflexum. Fossa spongiosa tibiaram anteriorum plus quam dimidium tibiaram occupans.

2. P. TRUCULENTUS. — *Niger, nitidus, lævis; antennis, rostro, limbo lato costali hemelytrorum, limbo abdominis pedibusque flavo-testaceis, in rufescentem vergentibus.* — ♀. — Long. 18 mill.; lat. 4 mill. — Australia (Mus. Brit.).

Caput thoracis lobo antico paulo brevius. Antennæ articulo primo capite tertia parte brevior, secundo basali duplo longiore. Thorax depressus, leviter constrictus, lobo antico magno, pone medium longitrorsum lineariter impresso. Scutellum apice nonnihil productum et leviter reflexum. Hemelytra abbreviata, thorace breviora. Femora antica inermia. Fossa spongiosa tibiaram anteriorum fere per totam longitudinem tibiaram extensa. Tarsi postici articulo apicali penultimo distincte nonnihil brevior.

3. *P. ORNATUS*. — *Obscure caruleus; rostro, corio, abdomine pedibusque rufescente-testaceis; parte apicali femorum posteriorum, tibiis posticis fere totis, apice tibiaram anteriorum, tarsis, clavo membranaque fuscis, hac basi flavo-albida; ventre pone medium maculisque tribus marginalibus abdominis obscure caruleis.* — ♂. — Long. 47 mill.; lat. 4 mill. — Nova-Hollandia (Mus. Brit.).

Articulus primus antennarum capite fere plus dimidio brevior. Thorax modice constrictus, lobo antico angusto, postico duplo longiore, basi longitrorsum impresso. Femora antica modice incrassata. Fossa spongiosa tibiaram anteriorum plus quam dimidium, intermediarum vix dimidium tibiaram occupans. Tarsi postici articulo apicali penultimo paulo brevior.

4. *P. DECORATUS*. — *Obscure caruleus; antennis, maculis marginalibus abdominis, apice coxarum, basi femorum posteriorum, apice femorum anteriorum, tibiis anterioribus, basi apiceque tibiaram posteriorum tarsisque testaceo-flavescentibus; hemelytris fusco-caruleis, membrana fusca, villa angusta corii ad suturam clavi, fascia arcuata basali, macula parva transversa ad apicem corii maculaque apicali membranae albidis.* — ♂. — Long. 13 mil.; lat. 3 mill. — Australia (Mus. Brit.).

Caput lobo antico thoracis sublongius. Antennæ articulo primo capite vix dimidio brevior. Thorax sat constrictus, lobo antico subtransverso, postico angustiore, convexiusculo, basi impresso. Scutellum apice productum et subreflexum. Femora antica sat incrassata. Fossa spongiosa tibiaram anticarum duas tertias partes, intermediarum dimidium tibiaram occupans. Tarsi postici articulo apicali penultimo distincte nonnihil brevior.

PHALANTUS g. n.

Caput crassum, pone oculos subito constrictum, collo brevissimo. Rostrum crassum, articulo apicali brevissimo. Thorax pone medium leviter constrictus. Scutellum apice productum. Pedes mediocres; femoribus anticis incrassatis, compressis, subtus ampliatis et spiuulosis; tibiis anticis femoribus brevioribus. leviter curvatis, in apice truncato fossa spongiosa instructis; tarsis posticis articulo ultimo penultimo nonnihil brevior.

Lestomero affine genus.

1. *P. GENICULATUS*. — *Niger; antennis fuscis, horum articulo primo; rostro, lobo antico thoracis, limbo angusto excepto, pedibusque testaceo-*

flavis; geniculis nigro-fuscis; thoracis lobo antico lineariter longitrorsum impresso, lobo postico minute ruguloso. — ♀. — Long. 11 mill.; lat. 3 mill. — Hongkong (Mus. Brit.).

ANDROCLUS g. n.

Caput crassum pone oculos subito valde constrictum, collo brevissimo, lobo medio elevato. Antennæ articulo primo brevissimo. Rostrum crassum articulo secundo reliquis longiore, ultimo gracili. Thorax distincte constrictus, marginibus lateralibus acuminatis, subdilatis. Scutellum apice leviter productum. Abdomen utrimque nonnihil dilatatum. Pedes breviusculi, femoribus anterioribus incrassatis, inermibus, tibiis anterioribus crassis, superne planis, apice subtus fossa spongiosa medioeri, apice producta, instructis; tarsis posticis articulo ultimo penultimo subbreiore.

Lestomero affine genus, ad quod verisimiliter etiam pertinet *Pirates pictus* H. Sch.

1. **A. GRANULATUS.** — *Fusco-testaceus; thorace granulato, lobo antico antice tuberculis duobus acutis armato, marginibus lateralibus minute obtuse crenulatis; maculis marginalibus abdominis; tarsis hemelytrisque sordide flavescente-testaceis, horum macula sat magna subbasali, clavum ferretotum et partem corii occupante, maculis compluribus minutis sparsis maculaque maxima membranæ nigris.* — ♀. — Long. 16 mill.; lat. $4\frac{1}{2}$ mill. — Dekan (Coll. Stål).

PACHYNOMUS Klug.

1. **P. BIGUTTATUS.** — *Nigro-piceus; macula apicali rotundata corii flavescente; tibiis tarsisque dilute piceis.* — ♂, ♀. — Long. 9-13 mill.; lat. $3\frac{1}{2}$ mill. — India orientalis (Coll. Stål).

Thorax lævis, linea longitudinali media impressa distincta, impressione transversa lineari postica fortiter punctata. Scutellum læve, spatio oblongo, medio distincte punctato. Hemelytra dense subtiliter ruguloso punctulata, angulo interno corii recto, apicali obtuso.

